

پاراویتا زینتراک | کود مایع روی



روی محلول (Zn):

۷۰٪ وزنی/حجمی | ۳۹,۸ وزنی/وزنی

شماره ثبت ماده کودی: ۰۶۶۳۱

فرمولاسیون غلیظ و یکنواخت؛
جذب سریع و اثر طولانی مدت

کود روی برگپاشی

مزایا و ویژگی‌ها



کمک به رشد و تقسیم سلولی



مشارکت در تولید هورمون رشد (اکسین) و فعالیت آنزیم‌ها



کمک به گل‌دهی و تشکیل بهتر میوه



کمک به بهبود کمیت و کیفیت محصول



رفع کمبود روی در محصولات زراعی و باغی

میزان مصرف

محلول‌پاشی: معمولاً ۱ لیتر در مقدار آب موردنیاز برای محلول‌پاشی یک هکتار؛ حداقل ۵۰۰ لیتر آب در هکتار.

گلخانه و نشاء: ۰,۵ لیتر در هکتار.

نشانه‌های کمبود روی

- کوچک و بدشکل شدن برگ‌های جوان
- زردی بین رگبرگ‌ها
- کاهش رشد و افت کیفیت محصول

زمان مصرف پیشنهادی

- درختان میوه و خشکباری:** پیش از بازشدن گل؛ تکرار پس از برداشت و پیش از خزان
- مرکبات و زیتون:** آغاز فصل رشد؛ تکرار پس از برداشت و پیش از خزان
- غلات:** مرحله ۳ برگی؛ در صورت نیاز تکرار پس از ۱۰ تا ۱۴ روز
- برنج:** آغاز پنجه‌زنی؛ در صورت نیاز تکرار پس از ۱۰ تا ۱۴ روز
- سبزی و صیفی:** مرحله ۴ تا ۶ برگی؛ در صورت نیاز تکرار پس از ۱۰ تا ۱۴ روز

مقدار آب بر اساس حجم لازم برای محلول‌پاشی یک هکتار تعیین شود. از مصرف در زمان گلدهی و گرده‌افشانی در فضای باز خودداری شود. پیش از اختلاط با سایر مواد، سازگاری را بررسی کنید. برای برنامه مصرف اختصاصی با شرکت کاوین مشورت کنید.

